

## SEZNAM LÉKŮ, KTERÉ PACIENT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ NESMÍ DOSTAT

V následujícím textu nejsou uvedeny veškeré léky, které mohou průběh nemoci či stav hybnosti u Parkinsonovy nemoci výrazněji zhoršit. Uvádíme zde jen léky nejčastěji užívané v České republice, se kterými může pacient s Parkinsonovou nemocí v ordinacích českých lékařů eventuálně přijít do styku.

- **Antipsychotika/Neuroleptika (tzv. typická):** léky používané hlavně, ale ne vždy, v léčbě duševních poruch: např. Haloperidol, Haldol, Largactil, Moditen, Tisercin, Levopromazin, Prochlorperazin, Perfenazin,
- **Některé léky používané při zažívacích obtížích:** Degan
- **Některé léky používané např. v léčbě závratí, nevolnosti, zvracení:** Torecan
- **Některé léky používané např. při nedostatečném prokrvení vnitřního ucha či mozku:** Stugeron, Cinnabene, Cinarizin, Arlevert, Sibelium
- **Některé léky, používané k tlumení kašle, škytavky:** Prothazin, Promethazin, Phenergan
- **Některé léky používané v léčbě vyššího krevního tlaku:** Crystepin, Aldomet, Dopamet, Dopegyt
- **Současně se selegilinem (Jumex, Sepatrem, Niar atd.) se nesmějí používat léky s antidepresivním účinkem.** Tyto léky lze pacientům s Parkinsonovou nemocí podávat, je však nutno předem vysadit selegilin, a to asi 3 týdny před nasazením antidepresiva.